

SOLACY

Mis à jour : Mardi, 23 Juillet 2013.

Médicament soufré

Dans quel cas le médicament SOLACY est-il prescrit ?

Ce médicament contient du soufre, de la [vitamine A](#) et des levures. Cette association vise à réduire l'[inflammation](#) de la [muqueuse](#) du nez et de la gorge.

Il est utilisé dans le [traitement d'appoint](#) des rhinopharyngites chroniques.

Présentations du médicament SOLACY

SOLACY Adulte : gélule (blanche) ; boîte de 45

- Non remboursé - Prix libre

SOLACY Adulte : gélule (blanche) ; boîte de 90

- Non remboursé - Prix libre

SOLACY Pédiatrique : comprimé pour suspension buvable (blanc, arôme fraise) ; boîte de 60

- Non remboursé - Prix libre

Composition du médicament SOLACY

	p gél	p cp
L-Cystine	72,6 mg	36,3 mg
Soufre précipité	22 mg	11 mg
Rétinol (vitamine A)	1 650 UI	1 000 UI
Levure <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	77,4 mg	38,7 mg
Saccharose	+	+

Substances actives : [L-cystine](#), [Rétinol acétate](#), [Saccharomyces cerevisiae](#), [Soufre précipité](#)

Excipients communs : Magnésium stéarate, [Saccharose](#)

Autres excipients (spécifiques à certaines formes) : Acide citrique, Amidon de maïs, Benzaldéhyde, Butylhydroxytoluène, Cellulose microcristalline, Éthylmaltol, Éthylvanille, Fraise arôme, Gamma-undécalactone, Gélatine, Glucose, Gomme arabique, Maltodextrine, Maltol, Pipéronal, Salicylate de méthyle, [Sodium](#) cyclamate, Titane dioxyde, Vanilline

Attention

Ce médicament contient de la [vitamine A](#) : son [surdosage](#) expose à des [effets indésirables](#) graves. Elle est présente dans de nombreux médicaments, dont certains sont disponibles en [automédication](#) : évitez de les associer sans avis médical.

Fertilité, grossesse et allaitement

Chez la femme enceinte ou qui allaite, les apports quotidiens en [vitamine A](#), sous forme de médicament, ne doivent pas dépasser 5 000 [UI](#) par jour.

Mode d'emploi et posologie du médicament SOLACY

Ce médicament est pris de préférence au cours d'un repas.

Les comprimés doivent impérativement être dissous dans un verre d'eau afin de limiter le risque de fausse route chez les enfants.

Posologie usuelle :

- Adulte : 3 gélules par jour.
- Enfant de 5 à 15 ans : 3 comprimés par jour.
- Enfant de 30 mois à 5 ans : 2 comprimés par jour.
- [Nourrisson](#) de 6 à 30 mois : 1 comprimé par jour.

La durée habituelle du traitement est de 3 mois.

Effets indésirables possibles du médicament SOLACY

Comprimé pédiatrique : douleurs d'estomac.