



Recto

# Rhinédrine

**RHINOPHARYNGITE - RHUME****solution pour pulvérisation nasale**

Bromure de benzododécinium

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?
3. Comment utiliser RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. Qu'est-ce que RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament est une préparation nasale pour usage local. Il est indiqué en cas de rhume et de rhinopharyngite.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?

### N'UTILISEZ JAMAIS ce médicament :

- en cas d'allergie connue aux antiseptiques de la classe des ammoniums quaternaires,
- chez le nourrisson de moins de 30 mois.

En raison de la présence en tant qu'excipients de dérivés terpéniques (camphre), ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- nourrissons de moins de 30 mois,
- enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non.

*En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

## FAITES ATTENTION avec ce médicament :

### Mises en garde spéciales

Dès l'ouverture du conditionnement, et a fortiori, dès la première utilisation d'une préparation à usage nasal, une contamination microbienne est possible.

Cette spécialité contient en tant qu'excipients des dérivés terpéniques (camphre), qui peuvent entraîner à doses excessives :

- des accidents à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
- des pauses respiratoires et des malaises chez le nourrisson.

Respectez les conseils d'utilisation, en particulier :

- ne jamais dépasser les doses recommandées (Cf. rubrique : Comment utiliser RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale),
- respecter les durées de traitement préconisées,
- pulvériser ce médicament en tenant le flacon bien vertical, l'embout vers le haut.

200mm measuring bar

Verso

## Précautions d'emploi

En cas de fièvre, maux de tête importants, douleur de l'oreille ou autres symptômes associés, consultez votre médecin.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, **DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.**

*En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

## Utilisation d'autres médicaments :

Ne pas associer plusieurs médicaments à usage nasal contenant un antiseptique.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

## Grossesse et Allaitement :

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

## Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.

## 3. Comment utiliser RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?

### Posologie :

#### Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 30 mois :

Adulte : 2 pulvérisations dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

Enfant de plus de 30 mois : 1 pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

### Mode et voie d'administration :

Voie nasale.

### Durée du traitement :

Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

**Si vous avez utilisé plus de RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale que vous n'auriez dû :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, notamment :

- allergie à type d'éternuements,
- écoulement nasal,
- réaction cutanée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. Comment conserver RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### Conditions de conservation

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. Informations supplémentaires

### Que contient RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale ?

#### La substance active est :

Bromure de benzododécinium .....0,0503 g pour 100 ml de solution pour pulvérisation nasale.

#### Les autres composants sont :

Camphre racémique, chlorure de sodium, polysorbate 80, eau purifiée.

### Qu'est-ce que RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme de solution pour pulvérisation nasale, flacon de 13 ml.

### Titulaire / Exploitant

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE  
Place Lucien Auvert  
77020 MELUN CEDEX

### Fabricant

FARMACLAIR  
440 avenue du Général de Gaulle  
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

### La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 12 juillet 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

8N818A00 - V01