

DIOSMINE MYLAN

600_{mg}



JAMBES LOURDES

30 COMPRIMÉS
voie orale

Mylan
SANTÉ FAMILIALE



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition : par comprimé
Diosmine 600 mg
Excipients : cellulose microcristalline, amidon de maïs, povidone, stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique
Boîte de 30 comprimés

Classe pharmaco-thérapeutique
VASCULOPROTECTEUR/MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES
(C05CA03 : système cardiovasculaire)

Titulaire - Exploitant :
MYLAN S.A.S.
117 Allée des Parcs
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Fabricant :
WEIMER PHARMA GmbH
Im Steingerüst 30
76437 RASTATT - ALLEMAGNE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (*jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher*),
- la crise hémorroïdaire.

ATTENTION !

! Mises en garde spéciales

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux ne diminuent pas en 15 jours, consultez votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre médecin.

Précautions d'emploi

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie. Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorise la circulation sanguine.

Interactions médicamenteuses

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

 Voie orale.

Posologie

Troubles de la circulation : 1 comprimé par jour le matin avant le petit déjeuner.

Crise hémorroïdaire : 2 à 3 comprimés par jour au moment des repas.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout médicament, ce produit peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- possibilité de troubles digestifs mineurs entraînant rarement l'arrêt du traitement.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Date de révision de la notice : 07/2007