

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent pendant 5 jours, consultez un médecin.

PROSPAN®
Sirop sans sucre



- La substance active est :

LIERRE GRIMPANT (extrait hydroalcoolique sec de feuille) 0,700 g
pour 100 ml de sirop.

- Les autres composants sont :

Eau purifiée, sorbitol à 70% (crystallisable), arôme cerise*, gomme xanthane, sorbate de potassium, acide citrique anhydre.

*composition de l'arôme cerise : vanilline, benzaldéhyde, huile essentielle de citron, alcoolat de cacao, eau de vie de cerise, alcoolat de framboise.

Titulaire : Laboratoire MEDIFLOR®
37, rue Saint-Romain – 69379 LYON CEDEX 08

Exploitant : Merck Médication Familiale
18C, boulevard Winston Churchill - 21070 DIJON

Fabricant : Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
D- 61138 NIEDERDORFELDEN - Allemagne

1. QU'EST-CE QUE PROSPAN® SANS SUCRE, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament de phytothérapie.

Flacon de 100 ml de sirop.

Traditionnellement utilisé dans les toux bénignes occasionnelles.

Traditionnellement utilisé au cours des affections bronchiques aiguës bénignes.

Attention : si les troubles persistent, consultez votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE PROSPAN® SANS SUCRE, sirop ?

Mise en garde

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Faites attention :

Ce médicament contient 0,04 meq de potassium par 5 ml de sirop. En tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.

Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement,

consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des exipients à effet notoire

Sorbitol, Potassium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE PROSPAN® SANS SUCRE, sirop ?

Bien agiter avant usage.

Posologie

Veillez doser le sirop PROSPAN® SANS SUCRE, avec le gobelet-doseur gradué.

- Chez l'adulte : 7,5 ml, 3 fois par jour pendant une semaine.
- Chez l'enfant de 5 à 15 ans : 5 ml, 3 fois par jour pendant une semaine.
- Chez l'enfant de moins de 5 ans : 2,5ml, 3 fois par jour pendant une semaine.

Mode d'administration

Voie orale.

Durée du traitement

1 semaine.

Si vous avez pris plus de PROSPAN® SANS SUCRE, sirop que vous n'auriez dû. Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PROSPAN® SANS SUCRE, sirop. Ne prenez pas de dose double

pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Effets non souhaités et gênants : en raison de la présence de sorbitol, possibilité de troubles digestifs et de diarrhées.

Des réactions cutanées peuvent être observées. Comme tous les médicaments, PROSPAN® SANS SUCRE, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PROSPAN® SANS SUCRE, sirop ?

Conserver à une température ne dépassant pas + 25°C et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : février 2008.



En France métropolitaine, Merck Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Merck Médication Familiale vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

L996973

Stand: 03/09; PB1673503