NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/08/2009

Dénomination du médicament

MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé

Chlorure de benzalkonium/Digluconate de chlorhexidine

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d'identification sur l'emballage extérieur)
- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent au-delà de 10 jours, ou s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, consulter votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?
3. COMMENT UTILISER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ANTISEPTIQUE (D. Dermatologie)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un antiseptique. Il est utilisé pour l'antisepsie et le nettoyage des petites plaies superficielles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Pour un bon usage du médicament:

Il est important de respecter les conseils de cette notice.

Si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Contre-indications

N'utilisez jamais MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé dans les cas suivants:

- Si vous êtes allergique à l'une des substances actives (la chlorhexidine ou le chlorure de benzalkonium) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique à un autre antiseptique de la même famille que ce médicament.
- Dans les yeux ou les oreilles.
- Pour désinfecter du matériel médico-chirurgical.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé:

Il existe un risque de passage des principes actifs dans la circulation générale en cas d'utilisation sur une grande surface, sous un pansement imperméable à l'eau et à l'air, sur une peau lésée (en particulier brûlée), une peau de prématuré ou une peau de nourrisson.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

- MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques, car ensemble ils risquent d'irriter votre peau ou d'être moins efficaces.

- Si vous utilisez du savon, rincez soigneusement avant d'appliquer MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

N'appliquez pas MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé sur les seins pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie/Mode d'administration

MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé s'utilise 1 ou 2 fois par jour, pendant 7 à 10 jours.

L'application doit durer au moins une minute, pour laisser agir le médicament.

Pulvériser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé sur la zone à traiter.

NE PAS AVALER

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Possibilité d'eczéma de contact (rougeur et démangeaison) en raison de la présence de chlorure de benzalkonium.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Conditions de conservation

Récipient sous pression: à protéger des rayons du soleil et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

Les substances actives sont:

Chlorure de benzalkonium
..... 0,500 g

(sous forme de solution de chlorure de benzalkonium)

Digluconate de chlorhexidine
..... 0,200 g

(sous forme de digluconate de chlorhexidine)

Pour 100 ml.

Les autres composants sont:

L'acide citrique monohydraté, le citrate de sodium, l'eau purifiée.

Gaz pulseur: azote.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.

Flacon de 50 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

MENARINI FRANCE

1/7 RUE DU JURA

ZONE SILIC - RUNGIS

91320 WISSOUS

Exploitant

MENARINI FRANCE

1/7 RUE DU JURA

ZONE SILIC - RUNGIS

91320 WISSOUS

Fabricant

LABORATOIRES CHEMINEAU

93 ROUTE DE MONNAIE

37210 VOUVRAY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.