

IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 MG, SUSPENSION BUVABLE EN SACHET



A quoi sert le IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 MG, SUSPENSION BUVABLE EN SACHET ?

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène.

Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant à partir de 30 kg (soit environ 11-12 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

Il est indiqué chez l'adulte, après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère à modérée, avec ou sans aura.

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)



Quel est le prix de ce médicament ?

Ce médicament est en prix libre, il n'est pas possible d'indiquer un prix.

Ce médicament peut être délivré sans ordonnance

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)



Quelle est la composition de ce médicament ?

Substance active

- ibuprofène

Excipients

- maltitol liquide
- sodium chlorure
- thaumatine
- xanthane gomme
- hypromellose (type non précise)
- glycerol (nature non précisée)
- sodium citrate
- citrique acide anhydre
- saccharine sodique
- eau purifiée
- arôme fraise
- sodium benzoate

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)



**Comment prendre IBUPROFENE VIATRIS
CONSEIL 400 MG, SUSPENSION BUVABLE EN**

SACHET ?

Posologie

Modes et voies d'administration

Affections douloureuses et/ou fébriles

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 30 kg (soit environ 11-12 ans).

La posologie usuelle est de 1 sachet (400 mg) par prise, à renouveler si nécessaire toutes les 6 à 8 heures, sans dépasser 3 sachets par jour (soit 1200 mg).

Le sachet dosé à 400 mg est réservé à des douleurs ou à une fièvre plus intense(s) ou non soulagée(s) par un sachet dosé à 200 mg d'ibuprofène.

Le sujet âgé présentant un risque accru d'effets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).

La posologie maximale est de 3 sachets par jour (1200 mg).

En cas de crise de migraine

RESERVE A L'ADULTE

1 sachet à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise.

Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Toutefois la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine.

Si la douleur réapparaît une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 prises.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)



Quelles sont les précautions d'emploi et contre-

indications de ce médicament ?

Précautions d'emploi

Grossesse et allaitement

Contre-indications

Si vous êtes une femme, IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des difficultés pour procréer ou chez lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL.

En cas d'administration chez le sujet âgé, ce médicament est à utiliser avec prudence.

Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS :

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 mg, suspension buvable en sachet ») ;
- de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves ;
- d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens) ;
- de maladie du cœur, du foie ou du rein ;
- de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau ;
- de prise d'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ;

- de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodéal ou d'hémorragie, par exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL (voir rubrique « Autres médicaments et IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 mg, suspension buvable en sachet ») ;
- de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pémétrexed (voir rubrique « Autres médicaments et IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 mg, suspension buvable en sachet »).

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS :

- de troubles de la vue, PREVEENEZ VOTRE MEDECIN ;
- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, présence de sang dans les vomissements, coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE ;
- d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE ;
- de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou (voir rubrique « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'acide acétylsalicylique (aspirine).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 mg, suspension buvable en sachet.

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)

Quelles sont les effets indésirables de ce

médicament ?

Fréquent

- Constipation
- Crohn
- Diarrhée
- Douleur abdominale
- Gaz
- Hémorragie
- Hémorragie gastro-intestinale
- Indigestion
- Inflammation de l'estomac
- Mal au coeur
- Mort
- Perforation
- Stomatite
- Ulcère
- Vomi
- Vomissements de sang

Rare

- Troubles visuels

Très rare

- Maladie de Lyell
- Réaction indésirable
- Syndrome de Stevens-Johnson
- Érythrodermie

- Érythème polymorphe

Fréquence indéterminée

- Allergie
- Hypertension
- Insuffisance cardiaque
- Oedème
- Pustulose exanthématique aiguë généralisée
- Réaction photosensible
- Syndrome de Kounis
- Éosinophilie

Fréquence non détectée

- Accident vasculaire cérébral
- Agranulocytose
- Anémie
- Anémie aplasique
- Anémie hémolytique
- Choc allergique
- Crise cardiaque
- Crise d'asthme
- Démangeaisons
- Hématurie
- Hémoglobine
- Hépatite
- Insuffisance rénale
- Leucopénie
- Mal de tête
- Méningite aseptique

- Nerveux/nerveuse
- Oedème facial
- Oligurie
- Pare
- Protéine urinaire positive
- Purpura
- Syndrome du LE
- Thrombopénie
- Transaminases
- Trouble du tissu conjonctif
- Tête qui tourne
- Urticaire chronique
- Urticaire géante
- Varicelle
- Volume de globules concentrés
- Éruption cutanée

Risques liés à la conduite

Ne pas conduire sans avoir lu la notice

En cas de doute, contactez votre médecin traitant.

En cas d'urgence composez le 15 pour être mis en relation avec le Service d'aide médical d'urgence.

 **Appeler le 15**

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)



Autres formes disponibles pour IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 MG, SUSPENSION BUVABLE EN SACHET ?

- IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 MG, COMPRIME PELLICULE

 Source Base de Données Publique des Médicaments (BDPM)



[↑ Haut de page](#)